

牛前胃病辨证论治

马斌山

(甘肃省武威市凉州区金塔镇畜牧站,甘肃武威 733000)

中图分类号:S823

文献标识码:A

文章编号:1001-9111(2020)06-0094-01

1 牛的前胃病一般都有以下中心证候特征

食欲、反刍减弱和停止,磨牙;胃肠蠕动减弱和停止;排粪不畅;有疼痛,病畜表现不安、拱背并呻吟;鼻镜干燥,精神不振,全身无力。

3 牛的前胃病临床有以下分证特征

3.1 瘤胃积食

3.1.1 望诊 常以更换草料或贪食引发,左肋胀大、腹痛不安、回头顾腹、后肢蹄腹、暖气酸臭、呼吸迫促、四肢开张。

3.1.2 触诊 瘤胃充满,坚实有切痕,叩诊时发生沉闷的声音。

3.1.3 听诊和粪便 初增强,后减弱或停止。粪便少而软,拉稀色呈暗。

3.1.4 口色及脉象 口色红燥,有黄苔,脉沉涩。

3.2 瘤胃鼓气

3.2.1 望诊 常吃易于发酵的饲料引发,发病急,病程重,腹围增大,尤其在左肋部明显,严重时高于背脊,张口呼吸。

3.2.2 触诊 触诊瘤胃充满,不坚实,富有弹性,无切痕,叩诊呈鼓音。

3.2.3 听诊和粪便 瘤胃音减弱停止,有明显金属音。粪稀量少,次数多且伴有恶臭。

3.2.4 口色和脉象 口色初期变化不大,后期青紫色,脉沉涩。

3.3 前胃弛缓

3.3.1 望诊 发病慢,病程长,头低耳耷、毛焦腹吊、行走无力、日久消瘦,常有慢性鼓气。

3.3.2 触诊 瘤胃充满,触压呈粥状的内容物或半液状。

3.3.3 听诊和粪便 瘤胃蠕动次数减少。粪便粗,有未消化的饲料,粪便秘稀交替出现。

3.3.4 口色及脉象 舌绵无力,淡白,口津滑利,脉细无力。

3.4 瓣胃阻塞

3.4.1 望诊 发热,鼻镜干燥龟裂、口臭、爱卧,重

时卧地不起,头贴于地面或回头顾腹。

3.4.2 触诊 触压瓣胃有痛感。

3.4.3 听诊和粪便 瓣胃蠕动减弱或停止。粪少而干涩,呈蒜盘珠状。

3.4.4 口色或脉象 口色红,苔黄,舌干起芒刺,脉沉涩。

3.5 创伤性网胃炎

3.5.1 望诊 站立时喜前高后低,不愿走下坡路,强行时盘旋而下,伏卧小心,有时关节外展,肌肉震颤,怕急转弯。

3.5.2 触诊 触压网胃有明显疼痛,表现抗拒。

3.5.3 听诊和粪便 网胃蠕动减弱。粪少不畅,带有粘液,有时带血。

3.5.4 口色或脉象 脉搏加快或疾而无力。

4 辨证论治

4.1 瘤胃积食

处方:刘寄奴 30 g、厚朴 30 g、青皮 25 g、木通 25 g、玉片 20 g、神曲 40 g、枳壳 25 g、山楂 40 g、香附子 20 g、茯苓 25 g、甘草 20 g。

4.2 瘤胃鼓气

治疗原则 理气导滞,宽肠消胀。处方 丁香 30 g、木香 24 g、藿香 30 g、青皮 45 g、陈皮 45 g、二丑 60 g、王片 20 g、石蜡油 500 mL。

4.3 前胃弛缓

治疗原则:补中益气,健脾和胃。

处方:黄芪 40 g、党参 35 g、白术 30 g、当归 25 g、陈皮 30 g、升麻 25 g、柴胡 25 g、炙甘草 25 g。

4.4 瓣胃阻塞

治疗原则:清热润燥,通利二便。

处方:生石膏 100 g、大黄 24 g、芒硝 120 g、滑石 30 g、二丑 30 g、油当归 40 g、番泻叶 30 g、枳壳 20 g、厚朴 30 g、苍术 10 g、陈皮 30 g、甘草 30 g、火麻仁 200 g。

4.5 创伤性网胃炎

治疗原则 目前尚无理想的治疗办法,一般采用保守疗法和手术疗法。

收稿日期:2020-10-06 修回日期:2020-10-16

作者简介:马斌山,男,甘肃武威人,兽医师,主要从事疾病治疗工作。